

# Staudenpflanzung Kreisverkehr Schlosswiesen, Goldbach

Standort: sonnig, trocken-frisch, mäßig nährstoffreicher, durchlässiger Boden

Botanischer Name	Deutscher Name	Höhe	Stck./m²	Blütezeit und -farbe	Nahrungspflanze für	Bemerkungen
<b>Gerüstbildner - hohe, standfeste und raumgliedernde Stauden, einzeln zu verwenden</b>						
Rudbeckia fulgida var. deami	Sonnenhut	80-100	3	Juli-September	Schmetterlinge Vögel	Winterschmuck, Ausläufer bildend
Calamagrostis x acutiflora 'Overdam'	Gestreiftes Reitgras	80-130	3	Juni-August		Im Frühjahr gelb gestreiftes Blatt, verblaßt später, Ähren schmücken bis in den Winter
Echinops ritro 'Veitchs Blue'	Kugeldistel	80	5	Juli-September	Bienen, Vögel Schmetterlinge	Schnittblume, Blütenstände zum Trocknen geeignet, blüht nach Rückschnitt erneut, graues Laub, keine Stacheln
Iris spuria 'Premier'	Steppeniris	120	3	Juli/August		Schnittblume, entwickelt sich erst nach 2-3 Jahren
Sedum telephium 'Karfunkelstein'	Hohe Fetthenne	55	3	September/Oktober	Bienen Schmetterlinge	Fruchtschmuck, dunkelrotes Laub, trockene Blütenstände auch im Winter attraktiv, Schnittblume
Kalimeris incisa 'Madiva'	Schönaster	80	5	Juli-Oktober	Bienen Schmetterlinge	Schnittblume, Laub färbt sich im Herbst gelborange
<b>Begleitstauden - meist halbohohe Stauden, die den Rahmen füllen, der durch die Gerüstbildner vorgegeben wird</b>						
Aster pyrenaicus 'Lutetia'	Pyrenäen-Aster	60	4	August/September	Bienen Schmetterlinge	Winterschmuck
Allium tuberosum 'Monstrosum'	Schnitt-Knoblauch	50-80	11	Juli - September	Bienen	eisbar, Versamung, bei unerwünscht Ausbreitung Rückschnitt vor Samenreife, grasartiges Blatt riecht nach Knoblauch
Coreopsis grandiflora 'Schnittgold' (Coreopsis palmata)	Mädchenaug	60	10	Juni-September	Schmetterlinge	Schnittblume, bodennaher Rückschnitt nach erster Blüte erhöht die Lebensdauer, versamt sich
Euphorbia dulcis 'Chameleon'	Süße Wolfsmilch	40	6	Mai-Oktober		dunkles Laub im Austrieb, Herbstfärbung, Versamung
Platycodon grandiflorus 'Mariesii'	Blaue Ballonblume	60	8	Juli/August	Bienen	Schnittblume, später Austrieb
Salvia nemorosa 'Caradonna'	Hain-Salbei	60	8	Mai und September	Bienen Schmetterlinge	Nachblüte (remontiert) wenn Rückschnitt bodennah sofort nach 1. Blüte, Schnittblume
Hypericum polyphyllum 'Grandiflorum'	Zwerg-Johanniskraut	15-20	16	Mai/Juni		z.T. wintergrün, auch zur Bepflanzung von Kästen oder Trockenmauern geeignet
<b>Füllpflanzen - durch Selbstaussaat Lücken besetzende Arten, die verschwinden, wenn sich die Vegetationsdecke schließt</b>						
Verbena bonariensis	Patagonischer Eisenhut	100-150	8	Juli-Oktober	Bienen Schmetterlinge	kurzlebig, Erhalt durch Versamung
Linaria purpurea 'Canon J. Went'	Purpur-Leinkraut	60-80	11	Juli-Oktober	Bienen Schmetterlinge	Erhalt durch Versamung, bei unerwünscht starker Ausbreitung Rückschnitt vor Samenreife, macht Ausläufer
<b>Bodendeckerstauden - niedrige, meist teppichbildende Arten, die in höherer Stückzahl gepflanzt werden</b>						
Aster ericoides subsp. pansus 'Snowflurry'	Teppich-Myrten-Aster	15	4	September/Oktober	Bienen Schmetterlinge	wächst flach ausgebreitet, eher am Rand setzen, späte Blüte
Erodium x hybridum	Großer Reiherschnabel	40-50	3	Mai-August	Bienen	Versamung, tief pflanzen da frostgefährdet
Anaphalis triplinervis 'Silberregen'	Perlkörbchen	20	11	Juni-August		als Einfassungs- und Schnittstauden geeignet, Winterschmuck, graulaubig
Geranium renardii 'Terre Franche'	Kaukasus-Storchenschnabel	30-50	11	Mai/Juni	Bienen Schmetterlinge	Blattschmuck, Rückschnitt nach erster Blüte, treibt erneut dichten Blattschopf aus, funktioniert auch am Gehölzrand
Anemone sylvestris	Hain-Anemone	40	16	Mai/Juni		Fruchtschmuck, kurze Ausläufer, passt auch vor und zwischen Gehölze
<b>Geophyten - Arten, die sich aus Zwiebeln, Knollen oder Rhizomen entwickeln und nur über wenige Wochen wirken</b>						
Allium christophii	Sternkugellauch	40-60	6	Juni/Juli	Bienen	einzel ablegen, verwildert, Schnittblume, Fruchtschmuck, Blütenstände zum Trocknen geeignet
Allium atropurpureum	Purpur-Lauch	80	80	Juni/Juli	Bienen	Schnittblume, Blütenstände zum Trocknen geeignet, einzeln ablegen
Nectaroscordum siculum ssp. bulgaricum	Bulgarischer Lauch	80-100	11	Mai/Juni	Bienen	einzel ablegen, verwildert
Chionodoxa forbesii 'Blue Giant'	Schneeglaz	20	200	März	Bienen	in Tuffs zu 10 Stck. ablegen, verwildert, für Beete und Gehölzränder
Crocus flavus (etruscus 'Zwanenburg')	Krokus	10	150	März	Bienen	in Tuffs zu 10 Stck. ablegen, verwildert
Tulipa clusiana	Damentulpe	30	80	April		in Trupps zu ca. 10 Stck., aber einzeln ablegen, verbreitet sich durch kurze unterirdische Ausläufer

Allgemeine Pflanz- und Pflegehinweise:

keine organischen oder künstliche Mulch- oder Bodenverbesserungsstoffe verwenden, bei schweren Böden Sand einbringen  
wenn, nur wenig düngen, beeinträchtigt die Winterhärte und Stabilität der Pflanze  
Blumenzwiebeln im Herbst zwischen die Stauden setzen, in jedes Pflanzloch nur eine Sorte  
Wässern ist nur während der Anwachsphase bei anhaltender Trockenheit erforderlich  
Stauden im zeitigen Frühjahr (spätestens wenn die Krokusse treiben) bis zum Boden zurückschneiden  
Laub der Zwiebelpflanzen erst nach dem vollständigen Eintrocknen entfernen

Lieferantenadressen: [www.stauden.de](http://www.stauden.de)  
Bund deutscher Staudengärtner, [info@stauden.de](mailto:info@stauden.de)

Mehr Informationen zum Projekt "Stadtbiene und Blumenwiesen": [www.craillsheim.de/stadtbiene](http://www.craillsheim.de/stadtbiene)